

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y SÓC TRĂNG KHOA DƯỢC-VT-TBYT <u>TỔ DƯỢC LÂM SÀNG</u> Số: 03/TB-TDLS				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u> Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2026.		
THÔNG BÁO CHỈ ĐỊNH-CHỐNG CHỈ ĐỊNH-CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 2025-2027						
Stt	Tên hoạt chất/thành phần dược liệu - Nồng độ - Hàm lượng	Tên thương mại	Đơn vị tính	Chỉ định	Chống chỉ định	Cách dùng-Liều dùng
1	Alfuzosin hydroclorid-5mg	ALANBOSS XL 5	Viên	Điều trị các triệu chứng chức năng mức độ trung bình đến nặng của phì đại tuyến tiền liệt lành tính.	- Suy gan. - Tiền sử hạ huyết áp tư thế. - Phối hợp với các thuốc khác chặn thụ thể alpha-1.	*Cách dùng: - Uống nguyên viên thuốc với một ly nước, không được nhai, bẻ đôi, làm vỡ hoặc nghiền viên thuốc. Thuốc có thể sử dụng cùng hoặc không cùng với thức ăn. - Liều đầu tiên nên uống trước lúc đi ngủ. Nên uống thuốc cùng một thời điểm mỗi ngày ngay sau bữa ăn. *Liều lượng: - Liều khuyến cáo: 1 viên/lần x 2 lần/ngày. - Không vượt quá 10mg/ngày. Liều lượng ở một số đối tượng lâm sàng đặc biệt: - Người cao tuổi (> 65 tuổi): Nên bắt đầu với 1 viên/lần/ngày vào buổi tối . Có thể tăng liều 10mg/ngày (1 viên/lần x 2 lần/ngày). - Suy thận nhẹ đến trung bình (độ thanh thải creatinin ≥ 30 ml/phút): Liều 1 viên/lần/ngày . - Suy gan: Chống chỉ định sử dụng alfuzosin dưới dạng viên nén phóng thích kéo dài hàm lượng 5mg. - Trẻ em 2-16 tuổi: Chống chỉ định sử dụng Alanboss XL5 ở trẻ em.

Stt	Tên hoạt chất/thành phần dược liệu - Nồng độ - Hàm lượng	Tên thương mại	Đơn vị tính	Chỉ định	Chống chỉ định	Cách dùng-Liều dùng
2	Alfuzosin hydroclorid- 10mg	XATRAL XL 10MG	Viên	- Điều trị triệu chứng chức năng của phì đại (tăng thể tích) lành tính tuyến tiền liệt. - Điều trị phụ trợ trong trường hợp bí tiểu cấp phải đặt ống thông tiểu do phì đại lành tính tuyến tiền liệt.	- Hạ huyết áp tư thế (cảm giác chóng mặt thường xuất hiện khi thay đổi từ tư thế đang nằm sang đứng dậy). - Suy chức năng gan (suy gan). - Suy chức năng thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30ml/phút). - Phối hợp thuốc với các thuốc có khả năng ức chế CYP 3A4 (ritonavir).	*Cách dùng: Phải nuốt trọn viên thuốc với một ly nước. Không được cắn, nhai, đập nát hoặc nghiền thành bột. *Liều dùng: Điều trị triệu chứng: Liều thông thường: 1 viên/ngày, ngay sau bữa ăn tối. Điều trị phụ trợ: 1 viên/ngày trong 3 đến 4 ngày, nghĩa là uống thuốc trong thời gian đặt ống thông tiểu 2 đến 3 ngày và 1 ngày sau khi rút ống thông tiểu. Trẻ em 2-16 tuổi không sử dụng thuốc này.
3		ALANBOSS XL 10				
4	Dutasterid-0,5mg	A.T DUTASTERIDE 0,5MG	Viên	Điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính.	- Suy gan nặng. - Phụ nữ. - Trẻ em.	*Cách dùng: Uống nguyên viên thuốc không được nhai, bẻ đôi viên thuốc. *Liều lượng: Người lớn: Liều 1 viên (0,5mg)/lần/ngày.
5	Flavoxat hydroclorid- 200mg	MEYERFLAVO	Viên	- Giảm nhẹ triệu chứng đau, đi tiểu luôn và đái dầm kết hợp với các rối loạn viêm đường tiết niệu. - Giảm nhẹ các co thắt bàng quang-niệu đạo do sử dụng dụng cụ hoặc phẫu thuật. - Giảm nhẹ triệu chứng nhưng không điều trị khỏi hẳn tiểu tiện khó, tiểu tiện đêm, đau trên khớp mu và đái dầm ở người có bệnh viêm bàng quang, viêm niệu đạo-bàng quang, viêm niệu đạo tam giác bàng quang và viêm tuyến tiền liệt.	- Tắc môn vị hoặc tá tràng. - Chảy máu đường tiêu hóa. - Tắc ruột, mất giãn (cơ trơn không giãn được). - Bệnh tắc đường niệu dưới.	*Cách dùng: Uống thuốc cùng với thức ăn hoặc sữa. *Liều dùng: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên 200mg x 3 lần/ngày. Giảm liều khi các triệu chứng được cải thiện. Trẻ < 12 tuổi không nên dùng.

Stt	Tên hoạt chất/thành phần dược liệu - Nồng độ - Hàm lượng	Tên thương mại	Đơn vị tính	Chỉ định	Chống chỉ định	Cách dùng-Liều dùng
6	Tamsulosin hydrochloride- 0,4 mg	FLOEZY	Viên	Điều trị triệu chứng của đường tiểu dưới (LUTS) liên quan đến tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH).	- Tiền sử hạ huyết áp thể đứng. - Suy gan nặng.	*Cách dùng: Uống nguyên viên, không được nghiền hoặc nhai. *Liều dùng: 1 viên/ngày. Trẻ em và tuổi trưởng thành tính an toàn và hiệu quả chưa được nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo:

- Thông tin nhà sản xuất.

TRƯỞNG KHOA DƯỢC-VT-TBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG

Lê Công Trầm

Phan Ngọc Tuyền